

Ibis sacro

Threskiornis aethiopicus Latham, 1790

Classe: Aves

Ordine Ciconiiformes

Famiglia Threskiornithidae



Adulto



112-124 cm

65 - 89 cm



Giovane



Caratteri: Trampoliere di medie dimensioni, con becco lungo ricurvo verso il basso. Colorazione tipicamente bianco-nera, becco e zampe neri.

Adulto: collo e capo completamente nudi e neri, ali bordate di nero.

Giovane: collo e capo con piume nere scure screziate di bianco sul davanti e chiare stiate di nero sul davanti.

Ibis sacro

Threskiornis aethiopicus Latham, 1790

Classe: Aves

Ordine Ciconiiformes

Famiglia Threskiornithidae



Specie simili



Garzetta *Egretta garzetta*



Spatola *Platalea leucordia*



Mignattaio *Plegadis falcinellus*



Cicogna *Ciconia ciconia*

Non confondibile con altre specie, ma, in condizioni di poca luce o a notevole distanza, possibile confusione con altre specie per via della colorazione e silhouette (spatola, mignattaio, garzetta, cicogna).


Ibis sacro

Threskiornis aethiopicus Latham, 1790

Classe: Aves

Ordine: Ciconiiformes

Famiglia: Threskiornithidae



Areale di origine



Areale di introduzione

CARATTERI ECOLOGICI

Habitat

Vasta tipologia di ambienti di regola dotati di acqua: zone umide d'acqua dolce, aree agricole, praterie. Nelle aree di introduzione francesi è un frequentatore di discariche.

Biologia ed ecologia

Predatore di piccoli animali: insetti terrestri e acquatici, pesci, anfibi, molluschi e crostacei, piccoli mammiferi e uova di uccelli, resti animali e vegetali. Nidifica in colonie anche miste con altri Ciconiiformi (aironi). Su alberi, canneto, cespugli o sul terreno vicino all'acqua. 2-4 uova (basso successo riproduttivo). Migratore al di fuori del periodo riproduttivo: nell'areale di origine le popolazioni a nord dell'equatore migrano ancora più a nord e quelle meridionali migrano più a sud. Scambio regolare tra colonie nell'areale di introduzione. Tendenzialmente gregario.

Areale di origine

Africa sub-sahariana, Iraq del sud, Madagascar and Aldabra Island. Fino al XIX sec. nidificante in Egitto.

Areale di introduzione

Prime segnalazioni in Spagna con riproduzioni nel 1974 di individui fuggiti dalla cattività, oggi eradicato. Italia: nidificante dal 1989. Francia: nidificante dal 1991. Belgio: un tentativo di nidificazione nel 2001. Olanda: alcune osservazioni. Regno Unito: alcune osservazioni.

In Italia

Nidificante acclimatato in Piemonte dal 1989 (prov. Vercelli) con 35-40 coppie nel 2004, attualmente è insediato in Emilia Romagna, Veneto, Lombardia (127 coppie nel 2017), Toscana. Presenze autunno-invernali anche consistenti con una stima di 4068 individui in 13 siti dormitorio distribuiti in 4 province piemontesi.

Ibis sacro

Threskiornis aethiopicus Latham, 1790

Classe: Aves

Ordine Ciconiiformes

Famiglia Threskiornithidae



Invasività	Specie invasiva.
Vie di introduzione	Le prime introduzioni sono dovute a fughe dalla cattività. Successivamente ci sono state diffusioni spontanee a partire dai nuclei riproduttivi.
Impatti biodiversità	Predazioni a danno di specie minacciate (insetti, anfibi, uccelli) specialmente in Francia all'interno di colonie di sterne e ardeidi dove preda le uova. Inoltre compete per i siti riproduttivi a scapito di ardeidi coloniali. Nei siti riproduttivi la vegetazione viene duramente compromessa a causa delle deiezioni.
salute	Sospettati impatti epidemiologici dovuti alla frequentazione di discariche e pozzi di liquame attualmente allo studio in Francia (rischio al momento non riferito all'Italia).
socio-economici	Registrati casi di distruzione della struttura delle saline in Francia. In Italia, danneggiamenti alle colture di asparago in Provincia di Ferrara.
Gestione	Le coppie nidificanti in Spagna sono presumibilmente state eradicte tramite abbattimenti. In Francia occidentale sono state intraprese azioni di controllo riducendo la popolazione nidificante da 1400-1800 coppie stimate nel 2007, a 900 nel 2009, lo stesso per la popolazione nidificante in Francia meridionale ridotta da 75 coppie stimate nel 2004 a 13 individui nel 2009.